

Nachgewiesene Hautflügler (Ameisen) auf rekultivierten Flächen des Rheinischen Braunkohlenreviers.

S: Südevier, V: Vile, BE: Berrenrath, FR: Frechen, BM: Bergheim, FO: Fortuna, FD: Frimmersdorf, G1: Garzweiler 1, H: Hambach, Z/I: Zukunft/Inden; RL: Rote Liste, D: Bundesrepublik Deutschland; 0: ausgestorben oder verschollen, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, V: zurückgehend, Art der „Vorwarnliste“. Nomenklatur und Klassifikation nach SEIFERT (2001).

Familie / Gattung / Art	S	V	BE	FR	BM	FO	FD	G1	H	RL:	D
										Z/I	97
Formicidae											
<i>Formica cunicularia</i>									x		
<i>Formica fusca</i>									x		
<i>Formica polyctena</i>						9a		9b	9b		V
<i>Formica rufibarbis</i>		x							x		V
<i>Formica</i> sp.			x								
<i>Lasius brunneus</i>		x							x		
<i>Lasius flavus</i>									x		
<i>Lasius niger</i>		x							x		
<i>Myrmica rubra</i>									x		
<i>Myrmica sabuleti</i>									x		V
<i>Myrmica</i> sp.									x		
<i>Ponera coarctata</i>									x		3
<i>Tetramorium caespitum</i>				x					x		
Arten:	0	3	1	1	0	1	0	1	12	0	

9a: DWORSCHAK, U. (2009): Beobachtung von *Formica polyctena* (Kleine Rote Waldameise) am Rande der Wiedenfelder Höhe (Tagebau Fortuna). - Mündliche Mitteilung

9b: DWORSCHAK, U. (2009): Beobachtung von Nestern der Kleinen Roten Waldameise (*Formica polyctena*) auf der Kasterer Höhe (Tagebau Garzweiler) und der Sophienhöhe (Tagebau Hambach). - Mündliche Mitteilung [Beobachtungszeitraum 2000-2009]