

Nachgewiesene Asselarten auf rekultivierten Flächen des Rheinischen Braunkohlenreviers.

S: Südrevier, V: Ville, BE: Berrenrath, FR: Frechen, BM: Bergheim, FO: Fortuna, FD: Frimmersdorf, G1: Garzweiler 1, H: Hambach, Z/I: Zukunft/Inden. Nomenklatur und Klassifizierung nach Boxshall (2004).

Familie / Gattung / Art	S	V	BE	FR	BM	FO	FD	G1	H	Z/I
Armadillidiidae										
<i>Armadillidium opacum</i>	x									
<i>Armadillidium vulgare</i>	x	x					x			x
Asellidae										
<i>Asellus aquaticus</i>									x	
<i>Proasellus coxalis</i>										8a
Ligiidae										
<i>Ligidium hypnorum</i>	x									
Oniscidae										
<i>Oniscus asellus</i>	x	x				x	x		x	x
Philosciidae										
<i>Philoscia muscorum</i>	x						x			x
Porcellionidae										
<i>Porcellio scaber</i>	x	x					x		x	x
Trachelipidae										
<i>Trachelipus nodulosus</i>	x									
<i>Trachelipus rathkii</i>	x	x							x	x
Trichoniscidae	x									
<i>Haplophthalmus mengei</i>	x									
<i>Trichoniscus pusillus</i>	x								x	
Arten:	10	4	0	0	0	1	4	0	6	5

8a: ALBRECHT, C., ESSER, T., KLEIN, H., LEIDERS, R., TILLMANNS, O., WEGLAU, J., WISSMANN, J. (2008): Zur ökologischen Entwicklung des im Rahmen der Inbetriebnahme angelegten neuen Inbetriebnahmeabschnitts. - Gutachten im Auftrag der RWE-Power AG in Vorbereitung. [Kartierung 2008]