

**Nachgewiesene Diplopodenarten auf rekultivierten Flächen des Rheinischen Braunkohlenreviers.**

S: Südrevier, V: Ville, BE: Berrenrath, FR: Frechen, BM: Bergheim, FO: Fortuna, FD: Frimmersdorf, G1: Garzweiler 1, H: Hambach, Z/I: Zukunft/Inden. Nomenklatur und Klassifizierung nach DEHARVENG (2004).

Familie / Gattung / Art	S	V	BE	FR	BM	FO	FD	G1	H	Z/I
<b>Glomeridae</b>										
<i>Glomeris intermedia</i>									x	
<i>Glomeris marginata</i>	x					x			x	
<i>Glomeris</i> sp.	x									
<b>Chordeumatidae</b>										x
<i>Chordeuma sylvestre</i>	x	x							x	
<i>Melogona gallica</i>	x	x							x	
<b>Craspedosomatidae</b>										
<i>Craspedosoma rawlini</i>	x	x							x	
<b>Blanulidae</b>										
<i>Nopoiulus kochii</i>	x	x								
<b>Julidae</b>										x
<i>Allajulus nitidus</i>	x								x	
<i>Cylindroiulus londinensis</i>	x	x								
<i>Cylindroiulus punctatus</i>	x	x							x	
<i>Julus scandinavicus</i>	x	x							x	
<i>Leptoiulus belgicus</i>	x	x								
<i>Ommatoiulus rutilans</i>									x	
<i>Ommatoiulus sabulosus</i>	x	x								
<i>Tachypodoiulus niger</i>	x								x	
<b>Polydesmidae</b>										x
<i>Brachydesmus superus</i>	x	x							x	
<i>Polydesmus angustus</i>	x	x							x	
<i>Polydesmus denticulatus</i>	x	x							x	
<i>Polydesmus inconstans</i>	x	x							x	
<i>Polydesmus</i> sp.									x	
<i>Propolydesmus testaceus</i>	x	x								
<b>Arten:</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>