

Nachgewiesene Weberknechtarten auf rekultivierten Flächen des Rheinischen Braunkohlenreviers.

S/V: Südvier/ Ville, BE/FR: Berrenrath/ Frechen, BM: Bergheim, FO: Fortuna, G: Garzweiler (Frimmersdorf/ Garzweiler 1 und 2), H: Hambach, Z/I: Zukunft/Inden. RL: Rote Liste, D: Bundesrepublik Deutschland; 0: Ausgestorben oder verschollen, 1: Vom Aussterben bedroht, 2: Stark gefährdet, 3: Gefährdet, V: Vorwarnliste, G: Gefährdung unbekanntes Ausmaßes, R: Extrem selten, D: Daten unzureichend, *: Ungefährdet. Nomenklatur und Klassifizierung nach BLICK & KOMPOSCH (2004).

Stand: 20.04.2022

									RL:	D
Familie / Gattung / Art	S/V	BE/FR	BM	FO	G	H	Z/I	2016		
Nemastomatidae										
<i>Mitostoma chrysomelas</i>	x									*
<i>Nemastoma bimaculatum</i>	x									*
<i>Nemastoma lugubre</i>						x				*
Trogulidae										
<i>Anelasmacephalus cambridgei</i>	x									*
<i>Trogulus nepaeformis</i>	x									D
Phalangiidae										
<i>Egaenus convexus</i> ¹						x				
<i>Lacinius ephippiatus</i>						x				*
<i>Lopholio palpinalis</i>						x				*
<i>Mitopus morio</i>						x				*
<i>Oligolophus tridens</i>	x					x				*
<i>Opilio saxatilis</i>							x			*
<i>Opilio</i> sp.							x			
<i>Paroligolophus agrestis</i>	x					x				*
<i>Paroligolophus meadii</i> ¹	x					x				
<i>Phalangium opilio</i>						x	x			*
<i>Rilaena triangularis</i>	x					x	x			*
<i>Leiobunum blackwalli</i>	x					x				*
<i>Leiobunum rotundum</i>	x					x				*
Arten:	10	0	0	0	0	12	4			

D	RL 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RL 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RL 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RL G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RL R	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arten gesamt: 18									

¹ = nicht in Deutschland vorkommend (Blick und Komposch 2004)